



GLOBAL LUNG CANCER
COALITION

Globale briefing:

Symptoombewustzijn, houdingen ten opzichte van longkanker en opvattingen over screening

Bevindingen uit een wereldwijde enquête

Overzicht

De Global Lung Cancer Coalition (GLCC) is een alliantie van patiëntenorganisaties die zich inzet voor het vergroten van bewustwording en begrip van longkanker en het voeren van campagnes om de uitkomsten van longkanker te verbeteren voor iedereen.

Het handvest voor patiënten van de GLCC bevestigt het recht van alle longkankerpatiënten op: behandeling met waardigheid en respect; vrijwaring van beschuldiging en stigmatisering door de ziekte en destigmatisering van hun ziekte; toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit; geïnformeerde zelfbeschikking; lichamelijke en geestelijke integriteit; en vertrouwelijkheid en privacy.

In 2023 gaf de GLCC opdracht voor zijn vierde multinationale onderzoek, om inzicht te krijgen in de houding ten opzichte van longkanker, het symptoombewustzijn onder het publiek en de opvattingen over longkankerscreening. Het onderzoek werd uitgevoerd in 29 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Peru, Portugal, Republiek Ierland, Slovenië, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. Er zijn reacties ontvangen van ten minste 1.000 volwassenen per land.

Het onderzoek wilde voortbouwen op de bevindingen van eerdere onderzoeken uit 2010, 2013 en 2017, die te vinden zijn op de GLCC-website.

Belangrijkste bevindingen

Symptoomherkenning

- Bijna vier op de tien mensen (37,5%) gaven aan geen symptomen van longkanker te kennen
- Mannen gaven vaker aan geen symptomen te kennen dan vrouwen (40,49% versus 34,85%)
- Mensen van 18-24 jaar gaven het vaakst aan geen symptomen te kennen (45,11%)
- Mensen die nooit hebben gerookt gaven vaker aan geen symptomen te kennen dan mensen die momenteel roken/in het verleden hebben gerookt (40,20% versus 36,65%)
- Er was aanzienlijke variatie tussen landen, waarbij het percentage mensen dat aangaf geen symptomen te kennen varieerde van 16,80% in Zuid-Afrika tot 54,36% in Japan

De GLCC roept overheden en gezondheidsstelsels over de hele wereld op om:

- De herkenning van symptomen van longkanker te vergroten door middel van gerichte publieke bewustwordingscampagnes
- De publieke voorlichting en het begrip van longkanker en de oorzaken ervan te verbeteren om stigma te verminderen
- Het belang van vroegtijdige diagnose en behandeling te benadrukken om de overlevingskansen te verbeteren en meer mensen aan te moedigen vroeg hulp te zoeken
- Nationale screeningsprogramma's voor longkanker in te voeren om mensen te helpen zo vroeg mogelijk te worden gediagnosticeerd en behandeld

Opvattingen over longkanker

- Meer dan vier op de tien mensen (42,62%) waren het eens met de stelling 'Ik heb minder sympathie voor mensen met longkanker dan andere soorten kanker'
- Mannen hadden minder sympathie voor mensen met longkanker dan vrouwen (50,38% versus 35,67%)
- Sympathie nam toe met de leeftijd, waarbij bijna 50% van de 18-24-jarigen aangaf minder sympathie te hebben voor mensen met longkanker
- Mensen die momenteel roken/in het verleden hebben gerookt waren enigszins minder sympathiek dan mensen die nooit hebben gerookt (43,15% versus 42,33%)

Opvattingen over longkankerscreening

- Meer dan acht op de tien mensen waren het erover eens dat er een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moet komen om mensen met longkanker te helpen vroegtijdig te worden gediagnosticeerd (84,89%)
- Mannen en vrouwen toonden bijna evenveel steun voor de noodzaak van screeningsprogramma's voor longkanker (84,12% versus 85,57%)
- De steun nam toe met de leeftijd, van 78,65% bij 18- tot 24-jarigen tot 86,01% bij mensen van 55 jaar en ouder
- Hoewel beide groepen grotendeels steun betoonden, toonden mensen die momenteel roken/in het verleden hebben gerookt nog meer steun dan mensen die nooit hebben gerookt (86,78% versus 82,48%)

Methodiek

De GLCC heeft het marktonderzoeksbureau Censuwide opdracht gegeven om tussen 3 juli 2023 en 6 juli 2023 een online enquête uit te voeren onder volwassenen in 29 landen. De steekproeven van de enquête omvatten ten minste 1.000 volwassenen (per land) en de gegevens werden gewogen op basis van leeftijd, geslacht en regio om een representatieve steekproef te verkrijgen in elk land. De respondenten kregen de volgende vragen voorgelegd:

- Vraag 1. Er bestaan veel waarschuwingssignalen en symptomen van longkanker. Noem alle mogelijke symptomen van longkanker die u kunt bedenken [een keuzevakje was aanwezig voor 'Ik weet het niet']
- Vraag 2. Longkanker wordt voornamelijk veroorzaakt door het roken van sigaretten en andere tabaksproducten. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Ik heb minder sympathie voor mensen met longkanker dan voor andere soorten kanker
- Vraag 3. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Er moet een nationaal screeningsprogramma voor longkanker komen om mensen met longkanker te helpen vroegtijdig te worden gediagnosticeerd

Verder onderzoek

Symptoomherkenning


Het is essentieel om het symptoombewustzijn van longkanker te vergroten, omdat de behandeling meer kans van slagen heeft als longkanker vroegtijdig wordt gediagnosticeerd.

Het onderzoek toonde aan dat het symptoombewustzijn over het algemeen laag is, waarbij bijna vier op de tien mensen (37,5%) aangaven geen symptomen van longkanker te kennen. Er was grote variatie tussen landen, maar verrassend genoeg was er weinig verschil op basis van rookstatus.


De bevindingen van de enquête wijzen erop dat er veel meer gedaan moet worden om het symptoombewustzijn van longkanker te vergroten.




Grafiek 1. Percentage van de respondenten dat aangaf geen symptomen te kennen, per land



Grafiek 2. Percentage van de respondenten dat aangaf geen symptomen te kennen, per leeftijd



Grafiek 3. Percentage van de respondenten dat aangaf geen symptomen te kennen, per rookstatus



Opvattingen over longkanker

Meer dan acht op de tien gevallen van longkanker zijn gerelateerd aan roken, wat leidt tot stigma rond de ziekte. Dit is een probleem, niet alleen omdat duizenden mensen longkanker krijgen die nooit hebben gerookt, maar ook omdat mensen die wel hebben gerookt zich schuldig kunnen voelen en een gesprek met hun arts over mogelijke symptomen kunnen uitstellen.

De GLCC is van mening dat iedereen, ongeacht de oorzaak van hun kanker, recht heeft op een hoogwaardige behandeling en zorg. Niemand verdient het om longkanker te krijgen, en als longkanker in een vroeg stadium kan worden ontdekt, verbetert dit de kans op een succesvolle behandeling en overleving.


Om opvattingen ten opzichte van longkanker te begrijpen, werd de deelnemers het volgende verteld: “Longkanker wordt voornamelijk veroorzaakt door het roken van sigaretten en andere tabaksproducten”. Vervolgens werd hen gevraagd of ze minder sympathie hebben voor mensen met longkanker dan voor andere soorten kanker.

Bijna vier op de tien mensen waren het eens met de uitspraak dat zij minder sympathie hadden voor mensen met longkanker, waarbij mannen en jongere deelnemers minder sympathie toonden dan respectievelijk vrouwen en oudere deelnemers. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van de peiling van 2017, waaruit bleek dat 21% van de respondenten aangaf minder sympathie te hebben.




Er was ook significante variatie tussen landen in het percentage volwassenen dat minder sympathie heeft voor mensen met longkanker, met antwoorden variërend van 31,77% van de deelnemers die het eens waren met de stelling in Noorwegen tot 79,35% die het ermee eens waren in Egypte.


Grafiek 4. Percentage van de respondenten dat het eens is met de stelling dat ze minder sympathie hebben voor mensen met longkanker dan voor andere soorten kanker, per land



Grafiek 5. Percentage van de respondenten dat het eens is met de stelling dat ze minder sympathie hebben voor mensen met longkanker dan voor andere soorten kanker, per leeftijd



Grafiek 6. Percentage van de respondenten dat het eens is met de stelling dat ze minder sympathie hebben voor mensen met longkanker dan voor andere soorten kanker, per rookstatus



Opvattingen over longkankerscreening

Een nationaal screeningsprogramma voor longkanker is een belangrijke maatregel om de aanzienlijke last te verlichten die de ziekte momenteel oplegt aan de getroffen personen, hun families en het land en de gezondheidszorg als geheel.


Screening op longkanker met een niet-invasieve scan van de longen (lage dosis computertomografie [LDCT]) kan levens redden door de ziekte in een vroeg stadium te detecteren wanneer deze mogelijk te genezen is. Een grote klinische proef van LDCT-screening toonde aan dat de longkankersterfte na 10 jaar follow-up 24% lager was bij mannen en 33% lager bij vrouwen, vergeleken met een situatie zonder screening (de Koning 2020).

Uit dit onderzoek bleek dat er wereldwijd ruime steun is voor nationale screeningsprogramma's voor longkanker, waarbij acht op de tien mensen het ermee eens zijn dat er in hun land een nationaal screeningsprogramma voor longkanker zou moeten komen. Hoewel de steun toenam met de leeftijd en mensen die momenteel roken/in het verleden hebben gerookt zelfs meer steun toonden dan mensen die nooit hebben gerookt (zie respectievelijk grafieken 8 & 9), is het bemoedigend dat er zoveel steun is.




Op dit moment hebben slechts enkele landen nationale screeningprogramma's voor longkanker. Gezien de impact die deze screeningprogramma's kunnen hebben en de wereldwijde steun ervoor, roept de GLCC beleidsmakers over de hele wereld op om nationale screeningsprogramma's voor longkanker te implementeren om mensen met longkanker zo vroeg mogelijk te kunnen diagnosticeren.


Grafiek 7. Percentage van de respondenten dat vindt dat er een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moet komen om mensen met longkanker te helpen vroegtijdig te worden gediagnosticeerd, per land



Grafiek 8. Percentage van de respondenten dat vindt dat er een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moet komen om mensen met longkanker te helpen vroegtijdig te worden gediagnosticeerd, per leeftijd



Grafiek 9. Percentage van de respondenten dat vindt dat er een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moet komen om mensen met longkanker te helpen vroegtijdig te worden gediagnosticeerd, per rookstatus



Meer informatie

De GLCC werd opgericht in 2001 en bestaat uit 43 niet-gouvernementele patiëntenorganisaties uit Argentinië, Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Peru, Portugal, Rusland, Slovenië, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Het GLCC bevordert wereldwijd het begrip van longkanker en het recht van patiënten op effectieve vroegtijdige opsporing, betere behandeling en ondersteunende zorg. Door op te treden als de internationale spreekbuis voor longkankerpatiënten zet de GLCC zich in om de resultaten van de ziekte te verbeteren voor iedereen.

Ga voor meer informatie over dit onderzoek en het werk van de GLCC naar:
www.lungcancercoalition.org of e-mail ons secretariaat op: glcc@roycastle.org.